



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colza                                                                                                                                             | Alternaria spp.                                                                                                                                        | 1 l/ha         | 2 | 10-14 días | 200 - 400 l/ha  | Aplicar mediante pulverización foliar. Aplicar durante BBCH 60-67. Uso menor conforme de acuerdo con la jerarquía nacional de cultivos.                                                                                                                                                                                                                  |
| Guisante para grano                                                                                                                               | Rabia del guisante, Ascochyta pisi                                                                                                                     | 0,8 - 1 l/ha   | 2 | 10 días    | 150 - 800 l/ha  | Aplicar durante BBCH 17-72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Roya del guisante, Uromyces pisi                                                                                                                       |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Guisante verde                                                                                                                                    | Rabia del guisante, Ascochyta pisi                                                                                                                     | 0,8 - 1 l/ha   | 2 | 10 días    | 150 - 800 l/ha  | Aplicar durante BBCH 17-72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Roya del guisante, Uromyces pisi                                                                                                                       |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Haba para grano                                                                                                                                   | Rabia del haba, Ascochyta fabae                                                                                                                        | 0,8 - 1 l/ha   | 2 | 10 días    | 150 - 800 l/ha  | Aplicar durante BBCH 20-79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Roya de la judía, Uromyces appendiculatus                                                                                                              |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Haba verde                                                                                                                                        | Rabia del haba, Ascochyta fabae                                                                                                                        | 0,8 - 1 l/ha   | 2 | 10 días    | 150 - 800 l/ha  | Aplicar durante BBCH 20-79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Roya de la judía, Uromyces appendiculatus                                                                                                              |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Judía para grano                                                                                                                                  | Rabia del haba, Ascochyta fabae                                                                                                                        | 0,8 - 1 l/ha   | 2 | 10 días    | 150 - 800 l/ha  | Aplicar durante BBCH 20-79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Roya de la judía, Uromyces appendiculatus                                                                                                              |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Judía verde                                                                                                                                       | Rabia del haba, Ascochyta fabae                                                                                                                        | 0,8 - 1 l/ha   | 2 | 10 días    | 150 - 800 l/ha  | Aplicar durante BBCH 20-79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Roya de la judía, Uromyces appendiculatus                                                                                                              |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cebada                                                                                                                                            | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Helminthosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres                                                                                           | 1 l/ha         | 1 | --         | 200 - 400 l/ha  | Aplicar durante BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas).                                                                                                      |
|                                                                                                                                                   | Oídio de los cereales, Blumeria graminis                                                                                                               |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Rincosporiosis, escaldado de cereales, Rhynchosporium secalis                                                                                          |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Roya parda o enana de la cebada, Puccinia hordei                                                                                                       |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Patata                                                                                                                                            | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                        | 0,5 l/ha       | 2 | 14 días    | 200 - 1000 l/ha | Aplicar durante BBCH 51-85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trigo                                                                                                                                             | Armillaria, podredumbre de la raíz, Armillaria mellea                                                                                                  | 1 l/ha         | 1 | --         | 200 - 400 l/ha  | Incluye escaña. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas). |
|                                                                                                                                                   | Oídio de los cereales, Blumeria graminis                                                                                                               |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis                                                                                                          |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Roya parda del trigo, Puccinia triticina                                                                                                               |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum                                                                                         |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola |                                                                                                                                                        |                |   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berenjena                                                                                                                                         | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica                                                                                                                   | 0,08 - 0,1 %   | 2 | 10 días    | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 51-89 (desde la aparición de la primera inflorescencia visible (1er botón erecto), hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).                                                                            |
| Calabacín                                                                                                                                         | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica                                                                                                                   | 0,075 - 0,08 % | 3 | 10 días    | 500 - 1000 l/ha | Dosis máxima de 0,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 51-89 (1a flor con peciolo alargado es visible en el tallo principal hasta Madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).                                                                                                                                                        |
| Calabaza                                                                                                                                          | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica                                                                                                                   | 0,075 - 0,08 % | 3 | 10 días    | 500 - 1000 l/ha | Dosis máxima de 0,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 51-89 (1a flor con peciolo alargado es visible en el tallo principal hasta Madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).                                                                                                                                                        |
| Melón                                                                                                                                             | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica                                                                                                                   | 0,075 - 0,08 % | 3 | 10 días    | 500 - 1000 l/ha | Dosis máxima de 0,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 51-89 (1a flor con peciolo alargado es visible en el tallo principal hasta Madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro).                                                                                                                                                        |



Mitigación de riesgos en la manipulación

**SEGURIDAD DEL APLICADOR (aire libre)**  
El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección C1 o tipo 6 + delantal C3 o PB3 o PB4 + calzado resistente a productos químicos; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección C1 o tipo 6 + calzado resistente a productos químicos.

**SEGURIDAD DEL APLICADOR (invernadero)**  
El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección C1 o tipo 6 + delantal C3 o PB3 o PB4 + calzado resistente a productos químicos; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección C3 o tipo 4 + calzado resistente a productos químicos.

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR**

- El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de protección C1 o ropa de trabajo adecuada + calzado cerrado.

**NORMATIVA APLICABLE:**

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección química tipo 4: frente a penetración de líquidos conforme a norma UNE-EN 14605:2005 + A1:2009.
- Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de protección nivel C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN-ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:**

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

**SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.**

| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          |                                                                                                                                                                                      |
| Pictograma                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Palabra de Advertencia                         |                                                                                                                                                                                      |
| Indicaciones de Peligro                        |                                                                                                                                                                                      |
| Consejos de Prudencia                          | P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.                                        |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1                                                                                                                                               |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                           |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                             |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                                                                                       |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales

S<sub>Pe</sub> 2: Para proteger a las aguas subterráneas, no aplicar en suelos que contengan un porcentaje de arena superior al 80%.

S<sub>Pe</sub> 2: Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar en suelos drenados para los cultivos de patata, alcachofa, brécol, coliflor, judía (aplicación tardía) y haba (aplicación tardía).

S<sub>Pe</sub> 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial, de:

- 5m para el uso en hortalizas de fruto bajo en invernadero permanente cerrado.
- 10m con cubierta vegetal para el uso en cereales, alcachofa, brécol coliflor, guisantes, judías verdes (con/sin vaina) (aplicación temprana), habas verdes (con/sin vaina) (aplicación temprana) y habas para grano (aplicación temprana).
- 20m con cubierta vegetal para el uso en pimiento, judías verdes (con/sin vaina) (aplicación tardía y múltiple), habas verdes (con/sin vaina) (aplicación tardía) y habas para grano (aplicación tardía).
- 20m, o el uso de boquillas de reducción de la deriva del 90%, o 10 metros con el uso de boquillas de reducción de la deriva del 75%, para el uso en caqui.

S<sub>Pe</sub> 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta la zona no cultivada, para el uso en caqui.

En arroz, el flujo de agua debe estar cerrado 5 días después de la aplicación.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

Otras leyendas e indicaciones.

- EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
- EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

